

Sondage de lentilles cornéennes prescrivants 2024

S.v.p. veuillez remettre ce questionnaire à un collègue si vous ne prescrivez pas de lentilles cornéennes (LC). Merci.
Veuillez compléter les questions ci-dessous, puis noter les détails des dix premiers patients que vous adaptez en LC après avoir reçu ce questionnaire. Voir au verso pour les explications et commentaires.

Quand avez-vous reçu ce sondage (la date) ?	Dans quelle province travaillez-vous?	Depuis combien d'années êtes-vous praticien licencié ?	Depuis combien d'années adaptez-vous des LC ?

Renseignements généraux ¹						Lentilles cornéennes rigides/PAG					Lentilles souples ²				Design de lentille ³										Fréquence de remplacement					# fois par semaine ⁴	Modalité ⁵			Système d'entretien					
Date	Px	Age	Sexe	Nouvelle Ajustement	Réajustement	Sclérale	PMMA	PAG Dk<40	PAG Dk40-90	PAG Dk >90	Conventionnelle <40%	Conventionnelle 40-60	Conventionnelle >60%	Silicone hydrogel	Sphère	Torique	Multi focale	Mono vision	Teinte cosmétique	Orthokératologie standard	Control de la myopie	Autre	Quotidienne	1-2 semaines	1 mois	3-6 mois	12 mois	Non-planifié	Port quotidien		Port prolongé	Tout usage	Peroxyde	Autre	Aucun				
1																																							
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							
8																																							
9																																							
10																																							

Quelques précisions :

- Nouveaux ajustements et réajustement:** Un nouvel ajustement est un nouveau porteur (aucune expérience antécédente) OU il n'a pas porté de lentilles cornéennes (LC) depuis plusieurs années. Un réajustement est un porteur qui est réajusté à cause que leur profile de port a changer. Il essaie une nouvelle LC afin de résoudre leur problème.
- Lentilles souples.** Celles ci sont divisés entre les lentilles en silicone hydrogel et les LC conventionnelles. Ces derniers sont divisés selon leur pourcentage de teneur en eau.
- Design de la lentille.** Identifier toutes les catégories qui s'appliquent. Orthokératologie standard : correction de la réfraction par orthokératologie. Control de la myopie : incluent l'ajustement de lentilles orthokératologie ou de lentilles souples spécialisées pour ralentir la progression de la myopie
- Nombre de fois par semaine les lentilles seront portées.** Si port quotidien, identifier le nombre de jours par semaine; si port prolongé, identifié le nombre de nuits/semaine les LC sont portées (maximum = 7 nuits).
- Modalité.** Les patients qui dorment avec leurs LC occasionnellement sont considérés comme des porteurs à port prolongé.

Une fois complété, SVP retournez cette fiche dans l'enveloppe adressé à Dr. Debbie Jones (School of Optometry, University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L3G1) AVANT le 30 juillet 2024, même si vous n'avez pas complété les 10 patients.